

**ZDE NALEPTE ŠTÍTEK**

(nevyužití štítky, prosím, nalepte na zadní stranu)

**Objednávka laboratorních vyšetření**  
**SYNLAB.CZ s.r.o.**CallCentrum: tel.: 277 779 800, fax: 224 812 793  
www.synlab.cz

Č. pojištění	Jméno
Příjmení	Pojišť.
Zákl. diag.	Odběr: datum čas
IČZ	Odbor. <input type="checkbox"/> Hospitalizace <input type="checkbox"/> Samoplátce <input type="checkbox"/> <b>STATIM</b>

**Analýza lidského genomu \*****Pokyny k odběru materiálu:****Vyšetření:**

- Faktor V Leiden
- FII - protrombin (G20210A)
- MTHFR C677T

**Druh materiálu:**

*nesrážlivá krev (EDTA)*  
*nesrážlivá krev (EDTA)*  
*nesrážlivá krev (EDTA)*

**Materiál:**

Nesrážlivá krev  
 Srážlivá krev  
 Moč  
 Stěr na Ch. trachomatis  
 Cervikální stěr – ostatní  
 Výtěr krk, nos, uretra

**Odběrová souprava:**

EDTA, 3-5 ml \*\*\*  
 bez separačního gelu, 3-5 ml  
 první porce ranní moči, 5-10 ml  
 brush, steril. zkumavka bez media  
 brush, steril. zkumavka bez media  
 vatový tampon bez media

**Skladování:**

2-8 °C , 24 h  
 2-8 °C , 24 h  
 2-8 °C , 24 h  
 2-8 °C , 24 h  
 2-8 °C , 24 h

**Extrahumánní genom****Hepatitidy:**

- Hepatitis B virus – průkaz DNA
- Hepatitis B virus – kvantifikace
- Hepatitis C virus – průkaz RNA
- Hepatitis C virus – kvantifikace

**Druh materiálu: \*\***

*srážlivá krev*  
*srážlivá krev*  
*srážlivá krev*  
*srážlivá krev*

**Urogenitální infekce:**

- HPV – průkaz High risk, Low risk
- Chlamydia trachomatis – průkaz DNA
- Neisseria gonorrhoeae – průkaz DNA
- Mycoplasma spp. – průkaz DNA
- Ureaplasma spp. – průkaz DNA

*výtěr, punktát*  
*výtěr, moč, punktát*  
*výtěr, moč*  
*výtěr, moč*  
*výtěr, moč*

**Ostatní:**

- Borrelia spp. – průkaz DNA
- Cytomegalovirus – průkaz DNA
- Helicobacter pylori – průkaz DNA
- Chlamydia pneumoniae – průkaz DNA
- Mycobacterium tuberculosis – průkaz DNA
- Streptococcus pneumoniae – průkaz DNA

*krev, moč, likvor*  
*nesrážlivá krev (EDTA), srážlivá krev*  
*stolice*  
*výtěr, BAL, popř. nesrážlivá krev*  
*sputum, BAL, moč, punktát*  
*BAL, nesrážlivá krev, likvor*

**Likvor****Punktát****Sputum****BAL**

sterilní zkumavka, 0,5-1 ml  
 sterilní zkumavka, min. 0,5 ml  
 sterilní zkumavka, min. 0,5 ml  
 sterilní zkumavka, min. 0,5 ml

2-8 °C , 24 h  
 2-8 °C , 24 h  
 2-8 °C , 24 h  
 2-8 °C , 24 h

**Upozornění:**

Odběr doporučujeme před zahájením ATB terapie, nebo nejdříve 14 dní po jejím skončení. Užívání ATB může způsobit inhibici PCR reakce – falešně negativní výsledky. Dbejte, aby nedošlo ke znečištění vzorku tálkem z rukavic!

\* Odběr krve k vyšetření lidské DNA byl proveden s informovaným souhlasem pacienta. Informovaný souhlas je založen v lékařské dokumentaci pacienta.

\*\* po dohodě s laboratoří lze provést vyšetření i z jiného materiálu

\*\*\* nelze vyšetřovat krev s heparinem, či citrátem!

Razítko lékaře  
IČZ, odbornost**Statim (telefon):**  
Poznámky: